



جایگزین شیر روماک ام پی

جایگزین شیر گوساله روماک ام پی ترکیب ویژه ای از مواد اولیه بر پایه شیر و سایر مواد مغذی مورد نیاز گوساله ها از شروع فاز تغذیه مایع تا زمان شیرگیری می باشد. استفاده از مواد اولیه با کیفیت و فرمولاسیون مناسب از ویژگی های جایگزین شیر روماک ام پی است. با استفاده از سیستم های همگن سازی و کاهش اندازه چربی در فرآیند تولید روماک، این ترکیب در دمای پایین تر نیز دارای حلالیت می باشد که از لحاظ استفاده عملی می تواند دارای اهمیت ویژه ای باشد. از نکات ویژه در تولید روماک ام پی انجام آزمایش های مداوم کلیه مواد اولیه و محصول در فرایند تولید می باشد.

پروتئین

پروتئین روماک ام پی تماماً از پروتئین های شیر (شیرخشک اسکیم و آب پنیر) بوده که قابلیت هضم بالایی در تغذیه گوساله های جوان دارند.

چربی

قابلیت هضم چربی در گوساله های جوان بستگی به طول زنجیره اسید چرب و نسبت بین اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع دارد. روغن استفاده شده در روماک ام پی، مخلوطی از روغن های گیاهی می باشد که دارای اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه و متوسط با قابلیت هضم بالا هستند.

مواد معدنی

مواد معدنی استفاده شده در روماک به صورت ترکیبات آلی (کیلاته) بوده که قابلیت جذب بهتری نسبت به فرم معدنی آن دارد.

ویتامین

ویتامین های A، D، E و ویتامین های گروه B در جایگزین شیر روماک ام پی جهت تاثیر بهینه محصول افزوده شده است. جایگزین شیر روماک حاوی پروبیوتیک پری بیوتیک و محرک های رشد می باشد که با تعدیل و حمایت فلور میکروبی مطلوب دستگاه گوارش مانع از ایجاد کلونی باکتری های مضر شده و بروز بیماری های گوارشی (اسهال) را کاهش می دهد.

خصوصیات ویژه روماک

- تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت مطلوب
- حلالیت بالا
- استفاده از پروتئین های شیر
- فیبر پایین (کمتر از ۱٪)
- وجود ویتامین ها، اسیدهای آمینه ضروری و مواد معدنی بیشتر نسبت به شیر
- حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و محرک های رشد
- جلوگیری از انتقال برخی بیماریها مانند یون و IBR
- مقرون به صرفه



ROMAK
MP MILK
REPLACER

دستورالعمل تغذیه جایگزین شیر گوساله روماک ام پی

- روماک ام پی را می توان از روز پنجم در تغذیه گوساله استفاده نمود.
- روماک ام پی را به نسبت ۱ به ۷-۸ (با توجه به نظر کارشناس تغذیه) با آب مخلوط نمایید.
- آب تمیز و کافی به صورت آزاد در اختیار گوساله قرار دهید.
- زمانی که میزان ماده خشک مصرفی گوساله به حدود ۱ تا ۱٫۵ کیلوگرم رسید می توان مصرف روماک ام پی را قطع نمود.
- بسته بندی شده در پاکت های سه لایه ۲۵ کیلوپی با ماندگاری ۱۲ ماهه.

ویتامین و عناصر کمیاب در هر کیلو گرم روماک ام پی	
۶۰,۰۰۰ IU/Kg	ویتامین A
۵,۷۰۰ IU/Kg	ویتامین D ₃
۵۰۰ mg/Kg	ویتامین E
۳۰۰ mg/Kg	ویتامین C
۲۰ mg/Kg	ویتامین B1
۱۰ mg/Kg	ویتامین B2
۸ mg/Kg	ویتامین B6
۱۰۰ Kg	ویتامین B12
۳ mg/Kg	ویتامین K
۲۰۰ Kg	بیوتین
۱ mg/Kg	فولیک اسید
mg/Kg۵۰۰	کولین کلراید
۵۰ mg/Kg	نیاسین
۲۵ mg/Kg	پانتوتنیک اسید
۱/۲۸۱۰ ^۹ (CFU/Kg)	پروبیوتیک
۱۰۰ mg/Kg	آهن
۱۰ mg/Kg	مس
۵۰ mg/Kg	منگنز
۱۲۰ mg/Kg	روی
۰/۵ mg/Kg	کبالت
۰/۵ mg/Kg	ید
۰/۳ mg/Kg	سلنیوم

میزان مصرف جایگزین شیر گوساله روماک ام پی			
سن	مقدار تغذیه در هر وعده (لیتر)	دفعات شیر دهی	مقدار مصرف روزانه
روز اول	۱/۳-۲	۳	حداکثر مصرف آغاز
روز ۲-۴	۱/۵	۳	۴/۵ لیتر شیر
روز ۵-۷	۲	۳	۶ لیتر جایگزین شیر روماک ام پی (۷۵۰ گرم جایگزین شیر)
هفته ۲-۹	۳-۴	۲	۸-۶ لیتر جایگزین شیر روماک ام پی (۷۵۰-۱۰۰۰ گرم جایگزین شیر)
هفته ۱۰-۱۲	۳-۴	۱	۴-۳ لیتر جایگزین شیر روماک ام پی (۳۷۵-۵۰۰ گرم جایگزین شیر)

آنالیز روماک ام پی	
۲۲٪	پروتئین
۱۸٪	چربی
۰/۱٪	فیبر
۹٪	خاکستر
۴٪	رطوبت

ROMAK MP MILK REPLACER

